

Lietuvos akušerių ginekologų draugijos nariui

2021 m. sausio 13 d.
Vilnius

LAGD KREIPIMASIS DĖL NĖŠČIŲJŲ IR ŽINDANČIŲ MOTERŲ SKIEPIJIMO NUO COVID-19 INFEKCIJOS

Pradėjus Lietuvoje skiepijamą nuo COVID-19 infekcijos nėštumą prižiūrintiems specialistams moterims, jų šeimos nariams, kyla klausimas apie šių vakcinų saugumą planuojančioms pastoti, nėščiosioms ir žindančioms moterims.

Atliekant klinikinius tyrimus su visomis 6 vakcinomis, nėščiosios ir žindančios moterys į šiuos tyrimus nebuvo įtraukiamos. Kelios dešimtys moterų, kurios pastojo tyrimo eigoje, šiuo metu stebimos, kitos jau pagimdė. Pašalinių reiškinių, vaisiaus raidos anomalijų, siejamų su vakcina, nenurodoma (1).

JAV akušeriai ginekologai, FDA aktyviai remia nėščiąjų ir žindančių vakcinaciją. Tuo tarpu PSO – skiepų nerekomenduoja, o pasiskiepijus – rekomenduoja pastoti tik po dviejų mėnesių. Didžiosios Britanijos akušeriai ginekologai rekomenduoja skiepyti tik tas nėščiąsias, kurios serga kitomis sunkiomis ligomis, yra po organų transplantacijos.

Mokslinių tyrimų duomenimis nėščiosios COVID-19 infekcija serga sunkiau nei to paties reprodukcinio amžiaus moterys. Dažniau sunkesne ligos forma serga moterys, turinčios antsvorį, sergančios pirmine arterine hipertenzija, cukriniu diabetu.

Lietuvos akušerių ginekologų draugija rekomenduoja, kad kiekvieną atvejį reikėtų įvertinti individualiai, pateikti pacientei informaciją apie vakcinų naudą konkrečiai moteriai (įvertinant nėštumo laiką, gretutines ligas, epidemiologinę aplinką) ir galimą šalutinį vakcinų poveikį. Gavusi išsamią ir objektyvią informaciją, pacientė pati galėtų apsispręsti. Net ir pasiskiepijus būtina laikytis bendrųjų asmens apsaugos priemonių naudojimo, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, socialinio atstumo išlaikymo, asmens higienos bei patalpų vėdinimo ir higienos reikalavimų.

Tikimės, kad atliekami tyrimai greitu laiku leis patikslinti rekomendacijas.

Lietuvos akušerių ginekologų draugijos
Prezidentė



prof. dr. Diana Ramašauskaitė



.L.A.G.D.

LIETUVOS AKUŠERIŲ
GINEKOLOGŲ DRAUGIJA

Informacijos šaltiniai:

1. Rasmussen SA, Kelley CF, Horton JP, Jamieson DJ. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccines and Pregnancy: What Obstetricians Need to Know. *Obstet Gynecol.* 2020 Dec 23; Publish Ahead of Print. doi: 10.1097/AOG.0000000000004290.
2. ACOG. COVID-19 Vaccines and Pregnancy: Conversation Guide for Clinicians. <https://www.acog.org/covid-19/covid-19-vaccines-and-pregnancy-conversation-guide-for-clinicians>.
3. ACOG. Vaccinating Pregnant and Lactating Patients Against COVID-19. <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-pregnant-and-lactating-patients-against-covid-19>
4. Guidance. COVID-19 vaccination: a guide for women of childbearing age, pregnant or breastfeeding. Updated 8 January 2021. <https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding/covid-19-vaccination-a-guide-for-women-of-childbearing-age-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding>
5. RCOG. Updated advice on COVID-19 vaccination in pregnancy and women who are breastfeeding. 30 December 2020. <https://www.rcog.org.uk/en/news/updated-advice-on-covid-19-vaccination-in-pregnancy-and-women-who-are-breastfeeding/>
6. World Health Organization. Who can take the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine? Updated 8 January 2021. <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-can-take-the-pfizer-biontech-covid-19-vaccine>