



.L.A.G.D.

LIETUVOS AKUŠERIŲ
GINEKOLOGŲ DRAUGIJA

Pagal adresatų sąrašą

2021 m. kovo 5 d.

Vilnius

LAGD KREIPIMASIS DĖL NĖŠČIŲJŲ IR ŽINDANČIŲ MOTERŲ SKIEPIJIMO NUO COVID-19 INFEKCIJOS

Lietuvoje pradėjus skiepijimą nuo COVID-19 infekcijos nėštumą prižiūrintiems specialistams, moterims, jų šeimos nariams, kyla klausimas apie šių vakcinų saugumą planuojančioms pastoti, nėščiosioms ir žindančioms moterims. Pateikiame šiuo metu žinomą informaciją apie skiepijimą nuo COVID-19 infekcijos.



.L.A.G.D.

LIETUVOS AKUŠERIŲ
GINEKOLOGŲ DRAUGIJA

PLANUOJANČIŲ PASTOTI, NĖŠČIŲJŲ IR ŽINDYVIŲ SKIEPIJIMO COVID-19 VAKCINA REKOMENDACIJOS (5,6,7)

Organizacija/ Vakcinos tipas	Nėščiosios	Nėščiosios, turinčios didesnę riziką užsikrėsti COVID-19 infekcija	Nėščiosios, ŽIV infekuotos	Nėščiosios, turinčios gretutinių ligų	Kontraindikacijos	Planuojančios pastoti	Žindančios moterys
PSO¹	Nerekomenduojama	Sprendžiama individualiai	Sprendžiama individualiai	Rekomendacijų nepateikta	Anamnezėje – sunki alerginė reakcija vakcinos komponentui (-ams)	Nėštumo planavimo atidėti nerekomenduojama	Rekomendacijų nepateikta
CDC¹	Nerekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Anamnezėje – sunki alerginė reakcija vakcinos komponentui (-ams)	Nėštumo planavimo atidėti nerekomenduojama	Sprendžiama individualiai
EMA	Nerekomenduojama	Sprendžiama individualiai	Sprendžiama individualiai (imunosupresijos atveju)	Rekomendacijų nepateikta	Anamnezėje – sunki alerginė reakcija vakcinos komponentui (-ams)	Nėštumo planavimo atidėti nerekomenduojama	Sprendžiama individualiai
JCVI	Nerekomenduojama	Sprendžiama individualiai	Sprendžiama individualiai	Sprendžiama individualiai	Anamnezėje – sunki alerginė reakcija vakcinos komponentui (-ams)	Nėštumo planavimo atidėti nerekomenduojama	Sprendžiama individualiai
FIGO¹	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Šiuo aspektu rekomendacija nepateikta	Rekomenduojama	Šiuo aspektu rekomendacijos nepateiktos	Nėštumo planavimo atidėti nerekomenduojama	Rekomenduojama
Pfizer	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomenduojama	Rekomendacijų nepateikta	Anamnezėje – sunki alerginė reakcija vakcinos komponentui (-ams)	Nėštumo planavimo atidėti nerekomenduojama	Rekomenduojama
Moderna	Nerekomenduojama	Sprendžiama individualiai	Sprendžiama individualiai	Rekomendacijų nepateikta	Anamnezėje – sunki alerginė reakcija vakcinos komponentui (-ams)	Nėštumo planavimo atidėti nerekomenduojama	Nežinoma
AstraZeneca	Nerekomenduojama	Sprendžiama individualiai	Sprendžiama individualiai	Rekomendacijų nepateikta	Anamnezėje – sunki alerginė reakcija vakcinos komponentui (-ams)	Nėštumo atidėti nerekomenduojama	Nežinoma

PSO – Pasaulio sveikatos organizacija. CDC – JAV ligų kontrolės ir prevencijos centras. EMA – Europos vaistų agentūra. JCVI – Jungtinis vakcinacijos ir imunizacijos komitetas, FIGO – Tarptautinė ginekologijos ir akušerijos federacija

¹Rekomendacijos pateiktos tik COVID-19 mRNA vakcinai.

Mokslinių tyrimų duomenimis nėščiosios COVID-19 infekcija serga sunkiau nei to paties reprodukcinio amžiaus moterys. Dažniau sunkesne ligos forma serga moterys, turinčios antsvorį, sergančios pirmine arterine hipertenzija, cukriniu diabetu. Nėščiosioms rekomenduojami skiepai nuo gripo (bet kuriuo nėštumo trečdaliu) bei stabligės, difterijos ir kokliušo (Tdap ar dTpa vakcina, 27⁺⁰ – 36⁺⁰ nėštumo savaitę). Nuo skiepavimo viena iš šių vakcinų ir skiepavimo nuo COVID-19 infekcijos laiko tarpas turėtų būti ne mažesnis nei 14 dienų (7).

Lietuvos akušerių ginekologų draugija rekomenduoja, kad kiekvieną atvejį reikėtų įvertinti individualiai, pateikti pacientei informaciją apie vakcinos naudą konkrečiai moteriai (gretutines ligas, epidemiologinę aplinką) ir galimą šalutinį vakcinos poveikį. Gavusi išsamią ir objektyvią informaciją, pacientė pati galėtų apsispręsti. Net ir pasiskiepijus būtina laikytis bendrųjų asmens apsaugos priemonių naudojimo, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, socialinio atstumo išlaikymo, asmens higienos bei patalpų vėdinimo ir higienos reikalavimų.

Tikimės, kad atliekami tyrimai, surinkti ir apibendrinti duomenys apie jau pasiskiepijusias nėščiąsias bei žindančias moteris greitai leis patikslinti rekomendacijas.

Lietuvos akušerių ginekologų draugijos
Prezidentė



prof. dr. Diana Ramašauskaitė



.L.A.G.D.

LIETUVOS AKUŠERIŲ
GINEKOLOGŲ DRAUGIJA

Informacijos šaltiniai:

1. Rasmussen SA, Kelley CF, Horton JP, Jamieson DJ. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccines and Pregnancy: What Obstetricians Need to Know. *Obstet Gynecol.* 2020 Dec 23; Publish Ahead of Print. doi: 10.1097/AOG.0000000000004290.
2. ACOG. COVID-19 Vaccines and Pregnancy: Conversation Guide for Clinicians. <https://www.acog.org/covid-19/covid-19-vaccines-and-pregnancy-conversation-guide-for-clinicians>.
3. ACOG. Vaccinating Pregnant and Lactating Patients Against COVID-19. <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-pregnant-and-lactating-patients-against-covid-19>
4. RCOG. Coronavirus (COVID-19) Infection in Pregnancy. Version 13: Published Friday 19 February 2021. <https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-virus-infection-and-pregnancy/>
5. WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-mRNA-1273. 25 January 2021. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/338862>
6. Joint IFFS/ ESHRE statement on COVID-19 vaccination for pregnant women and those considering pregnancy. https://www.eshre.eu/Europe/Position-statements/COVID19/JointESHRE_IFFSvaccination
7. FIGO statement. COVID-19 Vaccination for Pregnant and Breastfeeding Women. Published 2nd March 2021. <https://www.figo.org/covid-19-vaccination-pregnant-and-breastfeeding-women>



.L.A.G.D.

LIETUVOS AKUŠERIŲ
GINEKOLOGŲ DRAUGIJA

Adresatų sąrašas

Lietuvos šeimos gydytojų kolegija info@lsgk.lt

Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugija info@bpgdraugija.lt

Lietuvos akušerių asociacija akuseres@gmail.com

Lietuvos akušerių sąjunga akuseriusajunga@gmail.com