



.L.A.G.D.

LIETUVOS AKUŠERIŲ  
GINEKOLOGŲ DRAUGIJA

*Lietuvos akušerių ginekologų draugijos nariui*

2021 m. gegužės 7 d.  
Vilnius

## **ATNAUJINTAS LAGD KREIPIMASIS DĖL NĖŠČIŲJŲ IR ŽINDANČIŲ MOTERŲ SKIEPIJIMO NUO COVID-19 INFEKCIJOS**

Vykdamt Lietuvoje skiepijimā nuo COVID-19 infekcijos nėštumā prižiūrintiems specialistams, moterims, jų šeimos nariams, kyla klausimas apie šių vakcinų saugumą planuojančioms pastoti, nėščiosioms ir žindančioms moterims. Mokslinių tyrimų duomenimis nėščiosios COVID-19 infekcija serga sunkiau nei to paties reprodukcinio amžiaus moterys. Dažniau sunkesne ligos forma serga moterys, turinčios antsvorį, sergančios pirmine arterine hipertenzija, cukriniu diabetu. Atsiranda daugiau duomenų apie skiepijimā nuo COVID-19 infekcijos planuojančioms pastoti, nėščiosioms ir žindančioms moterims.

Įvertinusi šiuo metu esamą mokslinę informaciją, kitų pasaulio specialistų organizacijų bei atsakingų organizacijų rekomendacijas, LAGD teikia savo poziciją

- Planuojančioms pastoti skiepytis vakcina nuo COVID-19 ligos yra saugu, atidėti nėštumo planavimo nerekomenduojama. Nėra jokių mokslinių duomenų, jog vakcina galėtų turėti neigiamos įtakos vaisingumui.
- Planuojančioms vaisingumo gydymo procedūras, skiepytis vakcina nuo COVID-19 yra saugu. Dėl kartais vakcinos sukeliama imuninio atsako, vaisingumo gydymo procedūros gali būti atidedamos tam tikram laikui ir aptariamoms su vaisingumo specialistu.
- Visuotinis nėščiųjų skiepijimas nerekomenduojamas dėl teberenkamų žinių apie vakcinų nuo COVID-19 infekcijos veiksmingumą ir saugumą vaisiui ir naujagimiui. Šiuo metu turimi moksliniai duomenys ir paskiepytų nėščiųjų rezultatai rodo tokį pat vakcinos efektyvumą nėščiosioms kaip ir bendrai populiacijai, nepastebėtas joks galimas tiesioginis ar netiesioginis neigiamas poveikis besivystančiam vaisiui ar nėštumo eigai.
- Nėščiasias, turinčias didesnę riziką užsikrėsti COVID-19 infekcija bei gretutinių ligų rekomenduojama skiepyti COVID-19 mRNA vakcina.
- Žindyves rekomenduojama skiepyti COVID-19 mRNA vakcina.
- Nėščiosioms rekomenduojami skiepai nuo gripo (bet kuriuo nėštumo trečdaliu) bei stabligės, difterijos ir kokliušo (Tdap ar dTpa vakcina, 27+0 – 36+0 nėštumo savaitę). Nuo skiepijimo viena iš šių vakcinų ir skiepijimo nuo COVID-19 infekcijos laiko tarpas turėtų būti ne mažesnis nei 14 dienų.

Net ir pasiskiepijus būtina laikytis bendrųjų asmens apsaugos priemonių naudojimo, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, socialinio atstumo išlaikymo, asmens higienos bei patalpų vėdinimo ir higienos reikalavimų.



.L.A.G.D.

LIETUVOS AKUŠERIŲ  
GINEKOLOGŲ DRAUGIJA

Tikimės, kad atliekami tyrimai, surinkti ir apibendrinti duomenys apie jau pasiskiepijusias nėščiąsias greitai leis patikslinti rekomendacijas dėl visų nėščiųjų skiepavimo. Šiuo metu tik FIGO (Tarptautinė ginekologijos ir akušerijos federacija) rekomenduoja visas nėščiąsias ir žindyves skiepyti COVID-19 mRNR vakcina.

Lietuvos akušerių ginekologų draugijos  
Prezidentė



prof. dr. Diana Ramašauskaitė



.L.A.G.D.

LIETUVOS AKUŠERIŲ  
GINEKOLOGŲ DRAUGIJA

#### Informacijos šaltiniai:

1. Rasmussen SA, Kelley CF, Horton JP, Jamieson DJ. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccines and Pregnancy: What Obstetricians Need to Know. *Obstet Gynecol.* 2020 Dec 23; Publish Ahead of Print. doi: 10.1097/AOG.0000000000004290.
2. ACOG. Vaccinating Pregnant and Lactating Patients Against COVID-19. <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-pregnant-and-lactating-patients-against-covid-19>
3. <https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/coronavirus-covid-19-pregnancy-and-womens-health/covid-19-vaccines-and-pregnancy/covid-19-vaccines-pregnancy-and-breastfeeding/>
4. WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE\_recommendation-mRNA-1273. 25 January 2021. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/338862> ; <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-can-take-the-pfizer-biontech-covid-19--vaccine>
5. Joint IFFS/ ESHRE statement on COVID-19 vaccination for pregnant women and those considering pregnancy. [https://www.eshre.eu/Europe/Position-statements/COVID19/JointESHRE\\_IFFSvaccination](https://www.eshre.eu/Europe/Position-statements/COVID19/JointESHRE_IFFSvaccination)
6. Covid-19 vaccines and fertility. [https://www.britishfertilitysociety.org.uk/wp-content/uploads/2021/02/Covid19-Vaccines-FAQ-1\\_3.pdf](https://www.britishfertilitysociety.org.uk/wp-content/uploads/2021/02/Covid19-Vaccines-FAQ-1_3.pdf)
7. FIGO statement. COVID-19 Vaccination for Pregnant and Breastfeeding Women. <https://www.figo.org/covid-19-vaccination-pregnant-and-breastfeeding-women>
8. Gray KJ, Bordt EA, Atyea C, et al. COVID-19 vaccine response in pregnant and lactating women: a cohort study. *Am J Obstet Gynecol* 2021; doi.org/10.1016/j.ajog.2021.03.023
9. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html>
10. Stafford IA, Parchem JG, Sibai BM. The coronavirus disease 2019 vaccine in pregnancy: risks, benefits, and recommendations. *Am J Obstet Gynecol* 2021; doi:10.1016/j.ajog.2021.01.022
11. Shimabukuro TT et al. Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons. *N Engl J Med.* 2021 Apr 21. doi: 10.1056/NEJMoa2104983.